

حرکت

شماره ۲۹- ص ص : ۱۴۵ - ۱۲۳

تاریخ دریافت : ۰۵ / ۱۱ / ۸۴

تاریخ تصویب : ۱۴ / ۰۶ / ۸۵

بررسی رابطه بین مدت زمان استراحت در تمرینات ایتروال بر روی میزان آنزیم‌های *LDH* و *CPK* سرم خون در دانشجویان پسر و تأثیر مصرف ویتامین «ث» بر این آنزیم‌ها

دکتر علی‌اصغر رواسی^۱ - دکتر توراندخت امینیان وضوی - ابوالقاسم رزاقی

دانشیار دانشگاه تهران - استادیار دانشگاه تهران - کارشناس ارشد تربیت بدنی

چکیده

هدف از این پژوهش، بررسی اثر مدت زمان استراحت در بین تمرینات ایتروال و مصرف مکمل ویتامین ث بر روی مقادیر آنزیم‌های *LDH* و *CPK* سرم خون است. به این منظور سه گروه شامل گروه اول با ۱ دقیقه استراحت در بین دو وله دو ۴۰۰ متر، گروه دوم با ۳ دقیقه استراحت در بین دو وله دو ۴۰۰ متر و گروه سوم با ۳ دقیقه استراحت بین دو وله دو ۴۰۰ متر به همراه مصرف مکمل ویتامین ث در این پژوهش شرکت داشتند. این تحقیق از نوع نیمه تجربی، درون گروهی و بین گروهی است و از پیش و پس آزمون برای مقایسه تغییرات و بررسی نتایج استفاده شده است. آزمون آماری به کار گرفته شده *t-test* و *ANOVA* بود و داده‌های پژوهش با استفاده از نرم‌افزار *SPSS 10* مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. از آمار توصیفی با مطلع معنی داری > 0.05 و معنی‌نامه استنباطی برای آزمون فرضیه‌های تحقیق استفاده شد. جامعه آماری تحقیق را ۲۷ دانشجوی ورزشکار تشکیل می‌دادند که در ۳ گروه ۹ نفره مورد آزمون قرار گرفتند. نتایج تحقیق یانگر آن است که فعالیت بدنی موجب افزایش معنی‌داری در میزان آنزیم‌های *LDH* و *CPK* سرم خون می‌گردد ($P < 0.05$). معنی‌نامه استراحت بر روی میزان *LDH* سرم خون تأثیر معنی‌داری نداشت ولی مدت زمان استراحت بر روی میزان *CPK* سرم خون تأثیر معنی‌داری داشته است، به گونه‌ای که در گروه با استراحت بیشتر، میزان آنزیم مذکور کمتر بوده است ($P < 0.05$). مصرف ویتامین ث سبب افزایش معنی‌داری در میزان *LDH* و کاهش معنی‌داری در میزان *CPK* سرم خون شده است ($P < 0.05$).

واژه‌های کلیدی

ایتروال، لاكتات دهیدروژناز، کراتین قسموکیتاز، تمرینات متابول.

مقدمه

در برنامه تمرینی ایتروال، اعمال زمان مناسب برای دوره استراحت بین دو مرحله کار می‌تواند عامل بسیار مهمی در جلوگیری از بروز خستگی حاد و برحذر داشتن فرد از آسیب دیدگی احتمالی باشد. در اثر فعالیت بدنی شدید، آنزیم‌های کراتین کیناز و لاکاتات دهیدروژناز افزایش پیدا می‌کند و دوره بازیافت به سطح قبلی می‌رسد (۳۰٪). در ضمن طی ۲۴ تا ۴۸ ساعت پس از فعالیت بسیار شدید و همچنین در اثر ایجاد آسیب عضلانی مقادیر آنزیم‌های مذکور به یشتربین مقدار می‌رسد.

لاکاتات دهیدروژناز (LDH) واکنش زیر را کاتالیزور می‌کند:



این آنزیم در تمام بافت‌ها (حتی در گلوبول قرمز) به فراوانی وجود دارد. مقدار طبیعی آن در سرم 115 ± 20 میلی واحد در میلی لیتر است (۲). (در بعضی منابع ۱۰۵ تا ۳۳۳ واحد در لیتر بیان شده است).

کراتین کیناز (CK) واکنش زیر را کاتالیزور می‌کند:



این آنزیم به طور معمول در گلوبول قرمز وجود ندارد. مقدار طبیعی آن در سرم 5 ± 40 میلی واحد در میلی لیتر است (۲). (در بعضی مراجع ۲۲ تا ۱۹۸ واحد در لیتر بیان شده است).

تغییرات آنزیم لاکاتات دهیدروژناز دیرتر از تغییرات کراتین کیناز است.

تمرینات با خداکثر شدت و مدت کم نسبت به تمرینات با شدت کم و طولانی مدت، سبب افزایش بیشتر فعالیت آنزیم‌های سرم می‌شود و همراه با افزایش ضایعات عضلانی، مقدار آنها به حد اکثر خواهد رسید (۱۵). در مورد افزایش آنزیم‌های سرمی دو مکانیزم ممکن مطرح شده است (۱۳):

۱. افزایش نفوذپذیری ملول عضلانی در طول تمرین، و

۲. تغییر بافت عضلانی و مرگ ملول‌های عضلانی (نکروز).

تمرین بسیار شدید روی دوچرخه ارگونومتر و اندازه‌گیری آنزیم‌های CPK و LDH در خون طی ۳ دقیقه، ۶، ۲ و ۲۴ ساعت پس از تمرین، نشان داد که تمرینات غیرهوایی موجب افزایش سریع و ناپایداری در فعالیت لاكتات دهیدروژناز پلاسمایی شود و در میزان فعالیت کراتین کیناز افزایش طولانی‌تر و پایدارتری ایجاد می‌کند (۱۱).

در این تحقیق برای بررسی میزان تغییرات در غلظت‌های آنزیم CK و LDH سرم قبل و بعد از یک برنامه شنای ۱۰۰ متر آزاد در دو گروه مرد و زن، مشخص شد که اختلاف معنی‌داری در غلظت CK سرم قبل از اجرای تست براساس جنسیت وجود دارد. همچنین اختلافات معنی‌داری براساس جنسیت روی غلظت CK و LDH سرم پس از برنامه تمرینی مشاهده شد (۷).

براساس یافته‌های پژوهشی، فعالیت‌های ورزشی از نوع برونگرا صدمات شدیدتر را نسبت به دیگر انواع فعالیت‌های عضلانی موجب می‌شوند (۴). در اثر انقباض برونگرا یا ورزش شدید طی مدت طولانی به علت تغییر نفوذپذیری غشای سلولی به دلایل مختلف، تراوش آنزیم به وقوع می‌پیوندد. CPK و LDH دو نشانه فیزیولوژیکی و نشان دهنده ایجاد تغییرات در عضلات است (۱۸).

آسیب حاد یک عضو موجب می‌شود که طرح آنزیمی آن در سرم منعکس شود. آسیب‌های سلولی سبب بروز اختلال در نگهداری گرادیان غلظت بین داخل سلول و خارج سلول می‌شود که در نتیجه آن آنزیم به خارج از سلول انتشار می‌یابد. این آسیب همیشه نمی‌بایست از لحاظ ریخت‌شناسی^۱ قابل تشخیص باشد، بلکه حتی وقتی که خیلی ضعیفتر از نکروز هم باشد ممکن است موجب ریختن آنزیم به سرم شود. از لحاظ کلینیکی در انسان فعالیت‌های آنزیمی در سرم ممکن است حتی در حالت نیمه فیزیولوژیک مثل ورزش شدید عضلانی به طور چشمگیری افزایش یابد. این مسئله اولین بار توسط لو^۲ و هیشر^۳ مشاهده و در موش صحرابی و انسان تأیید شد. از طرف دیگر، مطالعات دقیق‌تر در انسان نشان داده که فقط ورزش‌های عضلانی بسیار شدید یا متوسط در اشخاص تمرین نکرده موجب افزایش آنزیم‌های سرم می‌شود به طوری که آنزیم‌های سرم به سطح موارد پاتولوژیک بررسد (۱).

1 - Morphologic

2 - Lole

3 - Hishler

نتایج تحقیق ژانگ^۱ نشان می‌دهد که میزان کراتین فسفوکیناز، لاکات دهیدروژنаз، میوگلوبین و واکنش‌های ذخایر عضلانی در تمام آزمودنی‌ها بعد از تمرین باشدت بالا به طور معنی‌داری افزایش می‌یابد. تمرینات باشدت زیاد و به طور مشخص وزنه‌برداری با حداقل شدت سبب صدمه به بافت عضلات اسکلتی می‌شود، در حالی که تمرینات منظم موجب افزایش قدرت تطابق و هماهنگی عضلات و کاهش میزان صدمات عضلانی می‌شود (۱۷). برای تعیین تأثیر مدت زمان و شدت تمرینات عضلانی بر تغییرات آنزیمی سرم و ضایعات عضلانی، تیدوس^۲ و لانزو^۳ انقباضات درونگرا و برونگرا عضلات بازکننده پا را مورد بررسی قرار دادند. نتایج حاصل طی ۸ تا ۴۸ ساعت پس از فعالیت از داده‌های خونی، بیانگر پیشترین افزایش در فعالیت آنزیم‌های سرم چون کراتین فسفوکیناز و اکسالوستیک و لاکات دهیدروژناز و ضایعات عضلانی بوده است (۱۵). اسید اسکوریک در انسان نقش مهمی را به عنده دارد. مکانیزم عمل این ویتامین هنوز روشن نیست. ویتامین ث در واکنش‌های اکسیداسیون و احیا شرکت می‌کند. همچنین انتقال هیدروژن بر عهده این ویتامین است. دینگ چنگ^۴ و همکاران با مطالعه آثار مصرف مقادیر بالای اسید اسکوریک (250 mg/kg) بر روی میوکارد بیمارانی که تحت عمل باشند پس قلب قرار گرفتند، به این نتیجه رسیدند که تغییرات در کراتین فسفوکیناز و لاکات دهیدروژناز سرم در گروه دریافت کننده اسید اسکوریک، در طی و پس از عمل قلب کمتر از گروه شاهد بوده است. بیماران گروه دریافت کننده اسید اسکوریک نسبت به گروه شاهد، مدت کمتری را در *ICU* باقی ماندند و احتیاج کمتری به ماندن در بیمارستان داشتند.

نتایج نشان داد که اسید اسکوریک می‌تواند همانند صافی برای کاهش رادیکال‌های آزاد چربی عمل کند (۱). این مدل التهابی حاد در انسان تأکید می‌کند که مصرف مکمل ویتامین ث بی‌درنگ پس از آسیب به طور ناپایدار، آسیب بافتی و تنفس اکسیداتیو را افزایش می‌دهد (۵).

1 - Zhang

2 - Tidous

3 - Lanozzo

4 - Ding Chao

علائم التهابی در اثر ورزش شدید در آزمودنی‌های غیرسازگار به تمرین ایجاد شده و موجب افزایش آهن آزاد می‌گردد. از جمله علائم قابل مشاهده در اثر تمرینات سخت و شدید، می‌توان از افزایش آنزیم‌های سرمی، افزایش آسیب DNA، تحریک تنفس اکسیداتیو و افزایش علائم آسیب سلولی نام برد. بویژه اینکه تمرینات بروونگرا منجر به ایجاد علائم مشخصی چون التهاب شدید و ادم می‌گردند (۵). با مصرف ویتامین ث آنتیاکسیدانت بیشینه پلاسمای افزایش می‌یابد. بیشتر یافته‌ها حاکی از آن است که مصرف مکمل ویتامین ث پس از التهاب شدیدی که در اثر تمرینات بروونگرا حادث می‌شود موجب افزایش قابل توجه تنفس اکسیداتیو و آسیب سلولی نسبت به افرادی که مکمل مصرف نمی‌کنند، خواهد شد. مصرف این مکمل‌ها موجب ایجاد تغییراتی چون افزایش میزان فلزات آزاد و فعال‌سازی پراکسیداسیون سلولی خواهد شد که می‌تواند به افزایش سطح تنفس اکسیداتیو و آسیب سلولی در آزمودنی‌ها منجر گردد (۵).

روش تحقیق جامعه‌آماری

جامعه‌آماری تحقیق، دانشجویان شرکت کننده در کلاس‌های ورزشی دانشگاه صنعتی شریف بودند که ۲۹ نفر از آنها به صورت انتخابی برای شرکت در این تحقیق در نظر گرفته شدند.

روش جمع‌آوری اطلاعات

اندازه قدر، وزن و سن تمام آزمودنی‌ها به دست آمد. پس از تعیین شاخص توده بدن (BMI)، افراد همگون سازی شدند و در نهایت ۲۷ نفر از آنها برای شرکت در تحقیق مناسب تشخیص داده شدند و سپس به ترتیب در سه گروه اول، دوم و سوم جای گرفتند. روز قبل از آزمون به آزمودنی‌های گروه سوم ۱۵۰۰ میلی‌گرم قرص ویتامین ث داده شد که در ۳ مقدار ۵۰۰ میلی‌گرمی طی ساعات ۱۲ شب، ۷ صبح و ۲ بعد از ظهر میل کنند. ساعت ۳ بعد از ظهر از هر سه گروه، اولین خون‌گیری به عمل آمد. سپس تمام گروه‌ها ۲۰ دقیقه با استفاده از حرکات کششی و دو آرام با شدت یکسان خود را گرم کردند. سپس آزمون دو و هله ۴۰۰ متر به صورت ایترووال برای هر سه گروه به اجرا درآمد و ۲ ساعت پس از فعالیت دوم، دومین خون‌گیری از آنها به عمل آمد.

برنامه تمرینی گروه اول شامل دو وله در ۴۰۰ متر با یک وله استراحت ۱ دقیقه‌ای بین فعالیت‌ها، برنامه تمرینی گروه دوم شامل دو وله‌دو ۴۰۰ متر با یک وله استراحت ۳ دقیقه‌ای بین فعالیت‌ها، برنامه تمرینی گروه سوم شامل دو وله در ۴۰۰ متر با یک وله استراحت ۳ دقیقه‌ای بین فعالیت‌ها و مصرف مکمل ویتامین ث بود. لازم به ذکر است که هر سه گروه به یک شدت دویلند. آنگاه نمونه‌های خونی جمع‌آوری شده با یخچال به آزمایشگاه منتقل شد تا میزان آنزیم‌های LDH و CPK سرم خون اندازه‌گیری شود.

روش‌های آماری

این تحقیق از نوع نیمه تجربی است و از پیش و پس‌آزمون برای مقایسه تغییرات و بررسی نتایج استفاده شد. آزمون آماری به کار گرفته شده $ANOVA$, $Paired Samples T-Test$ است که با استفاده از نرم‌افزار $SPSS10$ مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. از $T-test$ برای مطالعه درون گروهی و $ANOVA$ برای مقایسه بین گروه‌ها استفاده شد.

نتایج و یافته‌های تحقیق

در این تحقیق برای آزمون فرضیه‌های تحقیق از آمار توصیفی و آمار استباطی استفاده شد. متغیرهای مستقل تحقیق شامل مدت زمان استراحت و مصرف مکمل ویتامین ث و متغیرهای وابسته، شامل میزان تغییرات آنزیم‌های CPK , LDH سرم خون بر حسب واحد در لیتر خون است. سطح معنی‌دار نیز 0.05 در نظر گرفته شد.

در جداول ۱ الی ۱۱ وضعیت میانگین قد، وزن، سن و شاخص توده بدن برای سه گروه از آزمودنی‌ها به طور مجزا آورده شده است.

جدول ۱ - میانگین سن، قد، وزن و شاخص توده بدن آزمودنی ها

گروه سوم	گروه دوم	گروه اول	
۲۱/۴	۲۱/۹	۲۱/۶	میانگین سن
۱۷۷/۸	۱۷۴/۸	۱۷۶/۲	میانگین قد
۷۰/۲	۶۶/۳	۶۵/۰	میانگین وزن
۲۲/۲	۲۱/۸	۲۰/۸	میانگین شاخص توده بدن

جدول ۲ - توزیع CPK_1 آزمودنی ها

شاخص آماری	میانگین	تعداد	انحراف استاندارد	حداکثر	حداقل
CPK_1 گروه اول	۱۷۹/۳۳۳	۹	۲۲/۸۷۰	۲۰/۸/۰	۱۴۰/۰
CPK_1 گروه دوم	۱۷۷/۲۲۲	۹	۲۷/۲۲۰	۲۱۳/۰	۱۳۷/۰
CPK_1 گروه سوم	۱۳۶/۱۲۵	۹	۳۱/۰۹۸	۱۸۴/۰	۹۶/۰

جدول ۳ - توزیع CPK_2 آزمودنی ها

شاخص آماری	میانگین	تعداد	انحراف استاندارد	حداکثر	حداقل
CPK_2 گروه اول	۵۰/۸/۲۲۲	۹	۸۳/۰۳۰	۶۴۰/۰	۳۶۷/۰
CPK_2 گروه دوم	۴۱۸/۶۶۷	۹	۸۵/۳۸۴	۵۴۰/۰	۲۹۴/۰
CPK_2 گروه سوم	۲۲۰/۷۵۰	۹	۷۸/۴۱۷	۲۹۳/۰	۱۵۶/۰

جدول ۴ - توزیع LDH_1 آزمودنی ها

شاخص آماری	میانگین	تعداد	انحراف استاندارد	حداکثر	حداقل
LDH_1 گروه اول	۳۰۵/۰۰۰	۹	۷۹/۶۸۷	۴۱۷/۰	۱۷۰/۰
LDH_1 گروه دوم	۳۰۶/۰۵۶	۹	۶۴/۳۸۰	۴۲۲/۰	۲۰۱/۰
LDH_1 گروه سوم	۳۰۳/۲۷۵	۹	۹۵/۱۰۷	۴۲۹/۰	۲۲۹/۰

۱- کراتین فسفوکیتاز قبل از فعالیت

۲- کراتین فسفوکیتاز پس از فعالیت

۳- لاکتات دهیدروژناز قبل از فعالیت

جدول ۵ - توزیع LDH_2 آزمودنی‌ها

شاخص آماری	میانگین	تعداد	انحراف استاندارد	حداقل	حداکثر
گروه اول LDH_1	۴۲۱/۷۷۸	۹	۹۳/۱۸۶	۲۷۶/۰	۵۵۵/۰
گروه دوم LDH_1	۴۰۵/۲۲۲	۹	۶۹/۸۳۵	۲۹۷/۰	۴۹۹/۰
گروه سوم LDH_1	۵۷۷/۶۲۰	۹	۷۰/۰۱۲	۴۸۶/۰	۶۸۶/۰

جدول ۶ - نتایج آزمون T با نمونه‌های جفت بر روی LDH آزمودنی‌ها

گروه مورد مطالعه	میانگین اختلاف ضربی همبستگی	ارزش T	درجه آزادی	ارزش P	نتیجه
گروه اول	۱۱۶/۷۷۸	۰/۹۱۸	۹/۳۷۹	۰/۰۰۰	معنی‌دار
گروه دوم	۹۸/۶۶۸	۰/۹۴۱	۱۲/۴۷۲	۰/۰۰۰	معنی‌دار
گروه سوم	۲۲۴/۲۵۰	۰/۸۰۰	۱۷/۸۲۷	۰/۰۰۰	معنی‌دار

جدول ۷ - نتایج آزمون T با نمونه‌های جفت بر روی CPK آزمودنی‌ها

گروه مورد مطالعه	میانگین اختلاف ضربی همبستگی	ارزش T	درجه آزادی	ارزش P	نتیجه
گروه اول	۳۷۸/۸۸۹	۰/۱۲۶	۱۱/۸۷۹	۰/۰۰۰	معنی‌دار
گروه دوم	۲۴۱/۴۴۴	۰/۷۰۸	۱۰/۵۲۱	۰/۰۰۰	معنی‌دار
گروه سوم	۸۴/۶۲۵	۰/۶۲۵	۶/۳۹۸	۰/۰۰۰	معنی‌دار

جدول ۸ - نتایج آزمون آنالیز واریانس بر روی تراکم LDH

درجه آزادی	محاسبه شده F	ارزش P	نتیجه	
۲ ۲۳	۱۲/۱۱۴	۰/۰۰۰	معنی‌دار	بین گروهی درون گروهی

جدول ۹ - مقایسه های چندگانه برنامه ریزی نشده با استفاده از آزمون توکسی

نتیجه	P ارزش	میانگین اختلاف	گروه (J)	گروه (I)	متغیر وابسته	
غیر معنی دار	۰/۸۷۹	۱۶/۵۵۶	گروه دوم	گروه اول	LDH_2	
معنی دار	۰/۰۰۱	۱۵۵/۸۴۷*	گروه سوم			
غیر معنی دار	۰/۸۷۹	۱۶/۵۵۶	گروه اول	گروه دوم		
معنی دار	۰/۰۰۰	۱۷۲/۴۰۳*	گروه سوم			
معنی دار	۰/۰۰۱	۱۵۵/۸۴۷	گروه اول	گروه سوم		
معنی دار	۰/۰۰۰	۱۱۲/۴۰۳*	گروه دوم			

جدول ۱۰ - نتایج آزمون آنالیز واریانس بر روی تراکم CPK

نتیجه	P ارزش	F محاسبه شده	درجه آزادی	
معنی دار	۰/۰۰۰	۳۲/۰۷۹	۲	بین گروهی
			۲۳	درون گروهی

جدول ۱۱ - مقایسه های چندگانه برنامه ریزی نشده با استفاده از آزمون توکسی

نتیجه	P ارزش	میانگین اختلاف	گروه (J)	گروه (I)	متغیر وابسته	
معنی دار	۰/۰۴۸	۸۹/۵۵۶*	گروه دوم	گروه اول	CPK_2	
معنی دار	۰/۰۰۱	۱۵۵/۸۴۷*	گروه سوم			
معنی دار	۰/۰۴۸	۸۹/۵۵۶*	گروه اول	گروه دوم		
معنی دار	۰/۰۰۰	۱۹۷/۹۱۷*	گروه سوم			
معنی دار	۰/۰۰۰	۲۸۷/۴۷۷*	گروه اول	گروه سوم		
معنی دار	۰/۰۰۰	۱۹۷/۹۱۷*	گروه دوم			

آزمون فرضیه های تحقیق نشان می دهد که بین LDH پیش و پس آزمون در هر سه گروه اختلاف معنی داری وجود دارد. از این رو تمرینات ایتروال با ۱ دقیقه استراحت بین وله ها، با ۳

دقیقه استراحت بین وله‌ها و با ۳ دقیقه استراحت بین وله‌ها به همراه مصرف مکمل ویتامین ث، موجب افزایش معنی‌داری در سطح LDH سرم خون شدند. بین CPK پیش و پس‌آزمون در هر سه گروه اختلاف معنی‌داری وجود دارد، بنابراین تمرینات ایتروال با ۱ دقیقه استراحت بین وله‌ها، با ۳ دقیقه استراحت بین وله‌ها و با ۳ دقیقه استراحت بین وله‌ها به همراه مصرف مکمل ویتامین ث، موجب افزایش معنی‌داری در سطح CPK سرم خون شدند.

آزمون T نشان داد که بین CPK , LDH پیش و پس‌آزمون در هر سه گروه اختلاف معنی‌داری وجود دارد. همچنین آزمون آنالیز واریانس بر روی تراکم آنزیم CPK , LDH سرم خون نشان داد که بین سه گروه اختلاف معنی‌داری وجود دارد. ولی نتایج مربوط به LDH_2 آزمون توکی نشان داد که گروه سوم اختلاف معنی‌داری با ۳ گروه دیگر دارد و نتایج مربوط به CPK_2 آزمون توکی نشان داد که هر سه گروه با هم دیگر اختلاف معنی‌داری دارند.

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

بحث و نتیجه‌گیری

با توجه به اینکه هدف اصلی تحقیق مطالعه اثر زمان استراحت در تمرینات ایتروال روی تراکم آنزیم‌های لاکات دهیدروژناز و کراتین کیناز بود، مقایسه نتایج حاصل از پیش و پس‌آزمون به این شکل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت:

۱. مدت زمان استراحت تأثیر معنی‌داری روی تراکم LDH سرم خون نداشته است.
۲. مدت زمان استراحت بر روی تراکم CPK سرم خون تأثیر معنی‌داری داشته است.
۳. مصرف مکمل ویتامین ث موجب افزایش معنی‌داری در تراکم LDH سرم خون شده است.
۴. مصرف مکمل ویتامین ث موجب کاهش معنی‌داری در تراکم CPK سرم خون شده است. براساس نتایج حاصل از این تحقیق، زمان استراحت تأثیر معنی‌داری بر تراکم آنزیم LDH سرم خون نداشته است، ولی تمرین به خودی خود افزایش آنزیم LDH را در پی داشت.

نتایج تحقیقات کوبایاشی^۱ و همکاران، تیدوس و لانزو، پیلیس^۲ و همکاران و روبرتز^۳ و همکاران روی تأثیر فعالیت بدنه و افزایش تراکم آزیمی با تحقیق حاضر همخوانی دارند. از دلایل این همخوانی می‌توان شدت تمرین به کار گرفته در این تحقیق را نام برد.

یافته‌های تحقیقی توماس^۴ و سونگ^۵، کارامیزراک^۶ و همکاران و اوکاوا^۷ و همکاران با تحقیق حاضر مغایرت دارد. دلیل این مغایرت را استراحت اعمال شده در این تحقیق می‌توان نام برد.

نتایج حاصل از تأثیر زمان استراحت بر تراکم آزیم *CPK* حاکی است که افزایش زمان استراحت موجب کاهش تراکم آزیم پس از تمرین می‌شود. ولی تمرین شدید افزایش تراکم *CPK* را در پی دارد. نتایج تحقیقات تیدوس و لانزو، کارامیزراک و همکاران، پیلیس و همکاران و اوکاوا و همکاران با نتایج تحقیق حاضر همخوانی دارد که شدت تمرین به کار گرفته در این تحقیق می‌تواند دلیل این همخوانی باشد. اما نتایج تحقیقات توماس و سونگ با تحقیق حاضر مغایرت دارد که از دلایل آن می‌توان استراحت گنجانده شده در این تحقیق را نام برد.

بنابر نتایج این تحقیق، مصرف مکمل ویتامین ث موجب ایجاد تغییرات معنی‌داری در تراکم آزیم *LDH* سرم خون شده که در جهت افزایش نسبی این آزیم نسبت به دو گروه دیگر که ویتامین ث مصرف نکردند، بوده است.

نتایج تحقیقات چایلد^۸ و جاکوب^۹ (۲۰۰۱) (۵) با نتایج این تحقیق همخوانی دارد، ولی تحقیقات دینگ چتو و همکاران (۱۹۹۴) (۶) با آن مغایرت دارد.

نتایج این تحقیق نشان می‌دهد که ویتامین ث موجب ایجاد تغییرات معنی‌داری در تراکم آزیم *CPK* شده که در جهت کاهش نسبی این آزیم نسبت به دو گروه دیگر که ویتامین ث مصرف نکردند، بوده است.

- 1 - Kobayashi
- 2 - Pilis
- 3 - Robertz
- 4 - Thomas
- 5 - Song
- 6 - Karamizrak
- 7 - Ohkuwa
- 8 - Childs
- 9 - Jacobs

یافته‌های تحقیق دینگ چثر و همکاران (۱۹۹۴) (۶) با نتایج این تحقیق همخوانی ولی تحقیقات تامپسون^۱ و همکاران (۱۴) و چایلند و جاکوب (۱۶) با آن مغایرت دارد.

منابع و مأخذ

۱. بلورچیان، جواد؛ سلیمانی، خلیق. (۱۳۵۲). "آنزیم‌های سرم و استفاده از آنها در تشخیص بیماری‌ها". انتشارات دانشگاه تبریز.
۲. دوستی، محمود. (۱۳۷۷). "بیوشیمی با تفسیر در پزشکی". انتشارات دانشگاه تهران.
۳. کاشف، مجید. (۱۳۷۵). "بررسی اثرات دو نوع بازیافت فعال و غیرفعال بر آنزیم‌ها و گازهای خونی در مردان جوان ورزشکار"، رساله تحقیقی، دانشگاه تهران، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی.
4. Cheung K, Hume P, Maxwell L. (2003). "Delayed onset muscle soreness: Treatment strategies and performance factors". *sports Med*. 33 (2): PP:145-64.
5. Childs A, Jacobs C, Kaminski T, Halliwell B, Leeuwenburgh C. (2001). "Supplementation with Vitamin C and N-Acetylcysteine increases oxidative stress in human after and acute muscle injury induced by eccentric exercise". *Free radic bio Med*. Sep; 15; 31(6): PP:745 - 53.
6. Dingchao H, Zhiduan Q, Liye H, Xiaodong F. (1994). "The protective effects of high -dose ascorbic acid on myocardium against reperfusion injury during and after cardiopulmonary bypass". *Thorac cardiovasc Surg*. Oct. 42 (5): PP:276-8.
7. Fush, Youcy, Kong ZW. (2002). "Acute changes in selected serum enzyme and metabolite concentrations in 12 to 14 - years old athletes after an all - out 100m swimming sprint". *Percept Mot Skills*. Des; 95 (3 pt 2): PP: 1171-8.
8. Karamizrak SO, et al. (1987). "Change in serum ck, Idh and aldolase activities following supramaximal effort in athletes". *Turkish - J - sports - Med*. - Mar. 22 (1): PP:29- 35.
9. Kobayashi Y, Takeuchi T, Hosoi T, Yoshizaki H, Loepky JA. (2005). "Effect of a marathon run on serum lipoproteins, creatine kinase, and lactate dehydrogenase in recreational runners". *Res Q exerc. sport*. Dec. 76 (4): PP:450-5.
10. Ohkuwa T, Saito M, Miyamura M. (1984). "Plasma LDH and activities after 400m sprinting by well - trained sprint runners". *Eur J appl physiol Occup physiol*". 52 (3): PP:296-9.
11. Pilis W, Langfort J, Pilsniak A, Pyzik M. (1988). "Plasma lactate dehydrogenase and creatine kinase after anaerobic exercise". *Int J sports Med*. Apr; 9 (2): PP: 102-3.

12. Roberts AD, Billeter R, Howard H. (1982). "Anaerobic muscle enzyme change after interval training". *International journal of sports medicine*. Vol. 3, Issue 1, Feb.. PP: 18-21.
13. Schwane, J. et al. (1983). "Delayed - onset muscular soreness and plasma CPK and LDH activities after downhill running". *Med - Sci - Sports - Exerc.* 15 (1): PP: 51-6.
14. Thompson D, Williams C, Mc Gregor SJ, Nicholas CW, Mc Ardle F, Jackson MJ, Powell JR. (2001). "Prolonged vitamin C supplementation and recovery from demanding exercise". *Int J Sport Nutr exerc Metab*. Dec. 11 (4): PP:466-81.
15. Tiidus P.M, Lanuzzo CD. (1983). "Effects of intensity and duration of muscular exercise on delayed soreness and serum enzyme activities". *Med Sci Sports Exerc.* 15 (2): PP:461-5.
16. Thomas M, Song K, (1999). "Effect of anaerobic exercise on serum enzymes of young athletes". *J sport Med physical fitness*, 30: PP:138-41.
17. Zhang - yunkun. (1991). "Effects of weight lifting training on the levels of serum enzyme and myoglobin". *Sports - Sci.* 11 (4): PP:54-6.
18. www.nlm.nih.gov/medline_plus/ency/article, *Medical encyclopedia, medline plus health information*.

