

مقاله پژوهشی
اصیل
Original Article

فراوانی اختلال بیش فعالی با کمبود توجه در سابقه والدین کودکان مبتلا به این اختلال

دکتر کاترین صدری سهرمانی^{*}، دکتر الهام شیرازی^{**}، دکتر شبیه نوحه‌سرای^{***}

چکیده

مقدمه: مدل پژوهش تعیین فراوانی اختلال بیش فعالی با کمبود توجه در سابقه والدین کودکان مبتلا به این اختلال بود.

مواد و روش کار: به روش نمونه‌گیری در دسترس، والدین ۱۵ کودک زیر ۱۶ سال (۳۱ دختر و ۱۹ پسر) مبتلا به اختلال بیش فعالی با کمبود توجه که در سال‌های ۱۳۸۱ و ۱۳۸۲ به درمانگاه‌های روانپزشکی کودک و نوجوان دانشگاه علوم پزشکی ایران مراجعه نموده بودند بررسی شدند. تشخیص این اختلال در فرزندان برایه تشخیص بالینی و معیارهای چک‌لیست DSM-IV انجام شد. سابقه این اختلال در والدین نیز به کمک معیارهای چک‌لیست DSM-IV و مصاحبه روانپزشکی بررسی شد. داده‌ها به کمک روش‌های آمار توصیفی تحلیل گردیدند.

یافته‌ها: سابقه این اختلال در ۷۶٪ والدین وجود داشت. در ۲۰٪ موارد هر دو والد و در ۵۶٪ موارد یکی از آنها دارای سابقه مثبت بودند. فراوانی سابقه اختلال در پدران (۵۶٪) بیشتر از مادران (۴۰٪) بود.

نتیجه‌گیری: عوامل وراثتی می‌توانند در مسبب شناسی این اختلال و خالت داشته باشند.

کلیدواژه: اختلال بیش فعالی با کمبود توجه، والدین، عوامل وراثتی

مقدمه

اندازه و یا کاهش توجه و تمرکز بیماران می‌شود (садوک^۱ و سادوک، ۲۰۰۰). تشخیص دیرهنگام این اختلال می‌تواند پیامدهای زیانباری از جمله سوءصرف مواد و اختلال در روابط اجتماعی، تحصیلی و شغلی را در پی داشته باشد (بیدرمن^۲، فاراثون^۳، کینان^۴، کنی^۵ و تسوانگ^۶، ۱۹۹۰؛ بیدرمن و همکاران، ۱۹۹۲؛ فاراثون و همکاران، ۱۹۹۵؛ همکاران، ۱۹۹۵)

اختلال بیش فعالی با کمبود توجه^۱ (ADHD) از اختلال‌های شایع روانپزشکی در میان کودکان سینه دبستانی است. این موضوع در ایران نیز بررسی شده است (خوشابی، پوراعتماد، هومن و محمدی، ۲۰۰۴). این بیماری ۳-۵٪ کودکان را مبتلایی کند و موجب تحرک و فعالیت بیش از

E-mail: csadri7@yahoo.com

* روانپزشک، سازمان پزشکی قانونی کشور، تهران، خلخال جنوبی پارک شهر، خیابان بهشت (نویسنده مسئول).

** فوق تخصص روانپزشکی کودک و نوجوان، استادیار دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی - درمانی ایران، مرکز تحقیقات بهداشت روان.

تهران، کلیومتر ۷ جاده مخصوص کرج، مرکز آموزشی - درمانی روانپزشکی ایران.

*** روانپزشک، تهران، خیابان ستارخان، خیابان نیایش، نش خیابان شهد منصوری، استینتو روانپزشکی تهران و مرکز تحقیقات بهداشت روان.

1- Attention-Deficit Hyperactivity Disorder

4- Faraone

2- Sadock

5- Keenan

3- Biederman

6- Knee

7- Tsuang

مراجعه کننده به مرکز روانپردازی دانشگاه علوم پزشکی ایران بررسی شده است.

مواد و روش کار

این بررسی از نوع توصیفی- مقطعي است. آزمودنی های پژوهش ۳۰۰ نفر پدر و مادر (۱۵۰ زوج، والدین تی کودکان مبتلا به ADHD) بودند که بانمونه گیری در دسترس ۱۱ انتخاب شدند. کودکان این افراد در سال های ۱۳۸۱ و ۱۳۸۲ به درمانگاه های روانپردازی کودکان دانشگاه علوم پزشکی ایران مراجعه کرده بودند و بر پایه تشخیص بالینی روانپرداز کودک و نوجوان و معیارهای DSM-IV (انجمن روانپردازی امریکا^{۱۳}، ۱۹۹۴)، مبتلا به ADHD بودند. وجود سابقه ADHD در والدین، با مصاحبه بالینی توسط یک روانپرداز و بر پایه چک لیست DSM-IV بررسی شد. اطلاعات زمینه ای آزمودنی های نیز در پرسشنامه تاریخچه ای که توسط پژوهشگران تنظیم شده بود ثبت گردید. به منظور کاهش عوامل مخدوش کننده، والدین و کودکانی که سابقه طلاق یا جدایی در خانواده داشتند، دچار نارسایی های مهم عصبی (narasyi شناوی و بینایی، شنج و صرع)، عقب افتادگی ذهنی، اختلال در خودمانندگی و پسیکوز بودند و یا با زایمان دشوار و تماس با الكل و مواد مخدر در دوران جینی زاده شده بودند، از بررسی کنار گذاشته شدند. همچنین در صورتی که یک یا هر دو والد توانایی به یادآوری نشانه های دوران کودکی خود را نداشتند، کل خانواده از بررسی خارج می شد. داده های بدست آمده به کمک روش های آماری توصیفی ارزیابی گردید.

یافته ها

میانگین سنی کودکان و نوجوانان مبتلا به ADHD ۹/۱۷ سال (انحراف معیار ۳/۷) و سن همه آنها کمتر از ۱۶ سال بود. ۷۹/۳۳٪ (۱۱۹ نفر) پسر و ۲۰/۶۶٪ (۳۱ نفر) دختر بودند. ۲۰/۶۷٪ (۴۶ نفر) دچار نوع بیش فعالی- تکانه ای، ۱۸٪ (۲۷ نفر) از نوع کم توجهی و ۵۱٪ (۷۷ نفر) از نوع مختلط بودند.

غنى زاده، بهره دار و معینی، ۲۰۰۶؛ توکلیان، داوری آشتیانی، عربگل و امینی، ۲۰۰۳). در برخی موارد علایم تا بزرگسالی نیز آدامه می باید. بطور متوسط ۷/۶۰٪ تا ۸٪ از کودکان مبتلا به ADHD علایم آن را تا نوجوانی نیز نشان داده اند و ۱۰ تا ۵۰٪ آنها علایم را تا بزرگسالی به همراه داشته اند (آدلر^۱، کوهن^۲ و کنندی^۳، ۲۰۰۳). ۷/۶٪ تا ۱۰٪ از بزرگسالان جامعه دچار این اختلال هستند که سبب کاهش موقعیت های فردی و پایین آمدن موقعیت های اجتماعی در مقایسه با هوش آنان و چشمداشت های کلی می شود (садوک و سادوک، ۲۰۰۰؛ یدرمن و همکاران، ۱۹۹۳). بررسی ها نشان داده اند که ۴۵٪ تا ۹٪ از پدران و مادران کودکان مبتلا به ADHD دچار این اختلال بوده و نشانه های آن را تا نوجوانی به همراه داشته اند (فاراثون، یدرمن، فیگر^۴ و مانوتور^۵، ۲۰۰۰؛ اسمالی^۶ و همکاران، ۲۰۰۰؛ یدرمن و همکاران، ۱۹۹۰؛ یدرمن و همکاران، ۱۹۹۵). با وجود شیوع و اهمیت این اختلال، سبب شناسی آن هنوز به درستی شناخته نشده است. بررسی ها نشان داده اند که سابقه خانوادگی در ADHD باقی مانده تا بزرگسالی، قوی تر از ADHD محدود به دوران کودکی است و ۵٪ از فرزندان افراد بزرگسال دارای سابقه ADHD دچار این یماری هستند (همانجا). بررسی های انجام شده نشان داده اند که ADHD یک اختلال خانوادگی^۷ است و از اختلال در تنظیم مونوآمین های نورون های فرونتو- استریاتان ناشی می شود (بوئتلار^۸ و کوئیچ^۹؛ ۲۰۰۰؛ موگلیا^{۱۰}، جین^{۱۱} و کنندی، ۲۰۰۲).

خطر ابتلا در دوقلوهای تک تخمکی بیش از دو تخمکی بوده است. هم چنین احتمال ابتلای پسران، دو تانه برابر دختران گزارش شده است. برخی بررسی ها نشان داده اند که فراوانی موارد ابتلا به ADHD در خانواده های دختران مبتلا بیشتر از خانواده های پسران مبتلا است (اسمالی و همکاران، ۲۰۰۰).

هدف این پژوهش بررسی فرضیه انتقال و راثی این یماری بود. هر چند اثبات سبب شناسی و راثی نیازمند بررسی های گسترده تر به ویژه از نوع فرزند خواندگی و بررسی دوقلوها است، ولی بررسی میزان فراوانی علایم ADHD در خانواده های کودکان مبتلا نیز در این زمینه سودمند است. از این رو در پژوهش حاضر، فراوانی اختلال در والدین یولوژیک گروهی از کودکان و نوجوانان مبتلا به ADHD

برای تأیید وجود علایم ADHD والدین در دوران کودکی از دیگر محدودیت‌های پژوهش به شمار می‌رود. غیر از والدینی که علایم ADHD را به طور کامل یا نسبی هنوز با خود داشته‌اند، در مورد والدین دارای سابقه مثبت در دوران کودکی و بدون علامت فعلی، تنها به گفته‌های خود والدین استاد گردید؛ همچنین پدران و مادرانی که علایم ADHD را بر پایه خاطرات خود در گذشته رد کردند. این پژوهش تنها در کودکان دچار ADHD انجام شد و گروه کودکان سالم یا دارای دیگر اختلال‌های روانپزشکی و پزشکی برای مقایسه یافته‌ها بررسی نشدند.

پیشنهاد می‌شود بررسی‌های گستردۀ ترسی بر روی خویشاوندان درجه یک، دو و سه، فرزندخوانده‌ها و دوقلوها برای بررسی سبب‌شناسی و راثی انجام شود.

۲۵۰) (۸۳/۳۳ نفر) از والدین این کودکان دارای دیپم یا بالاتر، ۱۰٪ (۳۰ نفر) دارای مدرک پنجم ابتدایی و ۶/۶۶٪ (۲۰ نفر) دارای مدرک سیکل بودند. ۳۳/۳۳٪ والدین (۱۰۰ نفر) کارمند، ۱/۶۶٪ (۵ نفر) کارگر، ۲۵٪ (۷۵ نفر) دارای شغل آزاد و ۴۰٪ (۱۲۰ نفر از مادران) خانه‌دار بودند. در ۷۶٪ موارد، دست کم یکی از والدین و در ۲۰٪ موارد، هر دو والد دارای سابقه ADHD بودند. فراوانی سابقه ADHD در پدران بیشتر از مادران بود، به طوری که ۵۶٪ پدران و ۴۰٪ مادران دارای این سابقه بودند. در والدینی که دارای سابقه ADHD بودند (۱۴۴ نفر)، ۴۴/۴٪ (۶۴ نفر) سابقه نوع مختلف، ۴۳/۱٪ (۶۲ نفر) سابقه نوع بیش‌فعالی- تکائی و ۱۲/۵٪ (۱۸ نفر) سابقه نوع کم توجهی را گزارش کردند.

بحث

این بررسی نشان داد که فراوانی ADHD در پسران مورد بررسی بیشتر از دختران و فراوانی ADHD نوع مختلف بیشتر از انواع دیگر است که هر دو با یافته‌های اسمالی و همکاران (۲۰۰۰) هم خوانی دارد. این یافته نشان می‌دهد که میزان شیوع ADHD در گروه مورد بررسی بالا است. وجود سابقه ADHD در بیشتر والدین کودکان دارای ADHD احتمال تاثیر عوامل و راثی را در سبب‌شناسی آن مطرح می‌کند (همان‌جا). برخی بررسی‌ها نشان داده‌اند که ۵۷٪ از کودکان والدین دارای اختلال بیش‌فعالی با کمبود توجه از این بیماری رنج می‌برند (بیدرمن و همکاران، ۱۹۹۵). همچنین هر اندازه خویشاوندان فرد مبتلا به ADHD نسبت دورتری با بیمار داشته باشند، فراوانی گرفتاری در آنها کمتر خواهد بود (فارانون و بیدرمن، ۱۹۹۴).

بررسی‌ها نشان داده‌اند که اختلال کم توجهی در دختران بیشتر از پسران است (سادوک و سادوک، ۲۰۰۰) و بروز این بیماری در پسران موجب آشفتگی بیشتر خانواده‌ها و یا افت تحصیلی و کاهش موفقیت بارزتری می‌گردد (گریتز، ساویر، هیزل، آرنی و باگهورست، ۲۰۰۱). شاید فزونی پسران بر دختران در این بررسی ناشی از این امر باشد.

در این بررسی به دلیل محدود بودن شمار نمونه‌ها، امکان بررسی فراوانی ADHD در سابقه والدین به تفکیک جنسیت کودکان یا نوع ADHD آنان فراهم نشد. دسترسی نداشتن به پدران و مادران، بستگان و آموزگاران والدین مبتلا به ADHD

منابع

- Adler, L. A., Cohen, J., & Kennedy, R. (2003). Screening adults for ADHD. Available on: www.medscape.com. View program adult ADD.
- Akhondzadeh, S., Tavakolian, R., Davari Ashtiani, R., Arabgol, F., & Amini, H. (2003). Selegiline in the treatment of attention deficit hyperactivity disorder. *Progress in Neuropsychopharmacology & Biological Psychiatry*, 27, 841-845.
- American Psychiatric Association (1994). *Diagnostic and statistical manual of mental disorders (4th ed)*. Washington DC: American Psychiatric Association.
- Biederman, J., Faraone, S. V., Mick, E., Spencer, T., Wilens, T., Kiely, K., Ablon, J. S., Reed, E., & Warburton, R. (1995). High risk for attention deficit hyperactivity disorder among children of parents with childhood onset of the disorder: A pilot study. *American Journal of Psychiatry*, 152, 431-435.

- Biederman, J., Faraone, S. V., Spencer, T., Wilens, T., Norman, D., Lapey, E., Lehman, B. K., & Doyle, A. (1993). Patterns of psychiatry comorbidity, cognition, and psychosocial functioning in adults with attention deficit hyperactivity disorder. *American Journal of Psychiatry, 150*, 1792-1798.
- Biederman, J., Faraone, S., Keenan, B. J., Krifcher, B., Moore, C., Sprich-Buckminster, S., Ugaglia, K., Jellinek, M. S., Steingard, R., Spencer, T., Norman, D., Kolodny, R., Kraus, I., Perrin, J., Keller, M. B., & Tsuang, M. T. (1992). Further evidence for family- genetic risk factors in attention deficit hyperactivity disorder. *Archives of Genetic Psychiatry, 49*, 728-738.
- Biederman, J., Faraone, S., Keenan, K., Knee, D., & Tsuang, M. T. (1990). Family genetic and psychosocial risk factors in DSM-III attention deficit disorder. *Journal of American Academy of Child and Adolescence Psychiatry, 29*, 526-533.
- Buitelaar, J. K., & Kooij, J. J. (2000). Attention deficit hyperactivity disorder (ADHD): Etiology, diagnosis, and treatment. [Article in Dutch] *Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, 144*, 1716-1723.
- Faraone, S. V., & Biederman, J. (1994). Genetics of attention deficit hyperactivity disorder. *Child and Adolescent Psychiatric Clinics of North America, 3*, 285-301.
- Faraone, S. V., Biederman, J., Chen, W. J., Millberger, S., Warburton, R., & Tsuang, M. T. (1995). Genetic heterogeneity in attention-deficit hyperactivity disorder: Gender psychiatric comorbidity, and maternal ADHD. *Journal of Abnormal Psychology, 104*, 334-345.
- Faraone, S. V., Biederman, J., Feighner, J. A., & Monuteaux, M. C. (2000). Assessing symptoms of attention deficit hyperactivity disorder in children and adults: Which is more valid. *Journal of Consulting and Clinical Psychology, 68*, 830-842.
- Ghanizadeh, A., Bahredar, M. J., & Moeini, S. R. (2006). *Knowledge of attitudes towards attention deficit hyperactivity disorder among elementary school teachers*. The article Sent for publish to the *Journal of Patient Education & Counseling*, 2006, Feb. 24.
- Graetz, B., Sawyer, M., Hazell, P. L., Arney, F., & Baghurst, P. (2001). Validity of DSM-IV ADHD subtypes in a nationally representative sample of Australian children and adolescents. *Journal of American Academy of Child and Adolescence Psychiatry, 40*, 1410-1417.
- Khoushab, K., Pouretmad, H. R., Homan, A., & Mohammadi, M. R. (2004). Attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) among primary school students. *International Journal of Mental Health and Addiction, 7* Nov. available on: www.e-community-journal.com/contents/proc/abstract.
- Muglia, P., Jain, U., & Kennedy, J. L. (2002). A transmission disequilibrium test of the Ser 9/ GLY dopamine D3 receptor gene polymorphism in adult ADHD. *Behavioral Brain Research, 130*, 91-95.
- Sadock, B. J., & Sadock, V. A. (2000). Comprehensive textbook of psychiatry (7th ed.). Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins (p.p. 2679-2692).
- Smalley, S. L., McGough, J. J., Del H'omme, M., New Delman, J., Gordon, E., Kim, T., Liu, A., & McCracken, J. T. (2000). Familial clustering of symptoms and disruptive behaviors in multiplex families with ADHD. *Journal of American Academy of Child and Adolescence Psychiatry, 39*, 1135-1143.

Andesheh
Va
Raftari
الدكتور و دلبر

OA