



## فرآیند کاهش ارزش تعویقی و رفتارهای تکانشی: معرفی یک مطالعه مقدماتی

### **دکتر حامد اختیاری<sup>۱</sup>**

گروه علوم شاخنی،  
مرکز ملی تحقیقات اعتیاد

### **دکتر آرین بهزادی**

گروه علوم شاخنی،  
مرکز ملی تحقیقات اعتیاد

### **علی جنتی**

گروه علوم شاخنی،  
مرکز ملی تحقیقات اعتیاد

### **امیر مقیمی**

دانشکده فنی،  
دانشگاه تهران

**هدف:** فرآیند کاهش ارزش تعویقی عبارت است از کاهش ارزش واقعی یک پاداش یا آسیب در اثر به تأخیر افتادن زمان ارائه آن. این فرآیند، یکی از زیر ساختهای تصمیم‌گیری مخاطره‌آمیز است. در این مطالعه آزمون کامپیوتری فارسی با منطق استاندارد طراحی و استفاده گردید.

**روش:** در این مطالعه، ۱۰۰ آزمودنی دانشجو (۷۵ مرد)، در هشت مرحله متوالی، میان دریافت ۱۰۰ هزار تومان پس از یک وقفه ثابت و دریافت مقادیر فوری در حال کاهش، یک گزینه را انتخاب می‌کردند. **یافته‌ها:** میزان وقفه‌ای این مراحل عبارت بودند از: شش ساعت، یک روز، یک هفته، دو ماه، شش ماه، یک سال، پنج سال و ۲۵ سال. میانگین نقاط شکست افراد برای مقادیر وقفه به ترتیب عبارت بودند از: ۸۰، ۹۰۳۹۷، ۹۴۲۵۷، ۹۶۲۸۰، ۸۰۷۵۰، ۵۵۶۰۸، ۶۸۸۶۲ و ۱۴۲۰۸ تومان. در این مطالعه، هیچ تفاوت معنی‌داری بین گروه‌های زنان و مردان مشاهده نشد. **نتیجه‌گیری:** میزان کاهش ارزش تعویقی پاداش‌ها در مطالعه ما در مقایسه با

نمونه‌های غربی (بر روی ۱۰۰۰ دلار) بیشتر می‌باشد که ممکن است از عواملی چون نرخ تورم بالا، سوابق اقتصادی ناپایدار، بی اعتمادی به پرداخت پاداش در سال‌های آینده و بالاتر بودن ارزش ۱۰۰۰ دلار برای یک غربی، نسبت به ۱۰۰ هزار تومان برای یک ایرانی باشد.

### **مقدمه**

اقدام و براساس تحلیل نتایج، در انتخاب‌های بعدی، استراتژی گزینشی خود را اصلاح می‌کند. اختلال در هر یک از مراحل ذکر شده می‌تواند نوعی نقص در عملکرد افراد ایجاد کند که اصطلاحاً رفتار تکانشی، تکانشگری یا اختلال در کنترل تکانه نامیده می‌شود (اختیاری و بهزادی، ۱۳۸۰ الف و ب). با توجه به لزوم بررسی جنبه‌های مختلف و متفاوت برای شناسایی فرآیند RDM و آسیب‌شناسی آن، پژوهش در این زمینه در جهات مختلف

فرآیند تصمیم‌گیری مخاطره‌آمیز (RDM)، پردازشی شاخنی است که در طی آن پردازشگر از بین گزینه‌های ارائه شده بر اساس بار پاداش یا تنبیه آنها، زمان ارائه پاداش‌ها یا تنبیهات و احتمال ارائه آنها، گزینه مطلوب‌تر را انتخاب، برای رسیدن به آن

<sup>۱</sup>- نشانی ناس: تهران، خیابان کارگر جنوبی، پایین تر از میدان توپخانه، مرکز ملی تحقیقات اعتیاد (INCAS)

E-mail: H\_Ekhtiani@yahoo.com



مشخص و ثابت (D)، در مقایسه با مقادیر در حال کاهش پاداش در زمان حال (V) سنجیده می‌شود. در طی طرح پی دربی سوال‌ها و کاهش میزان پاداش آنی، فرد بالآخره در نقطه‌ای به نام نقطه شکست<sup>۱</sup> (IP)، پاداش همراه با وقفه را ترجیح می‌دهد. در این شرایط مقداری از پاداش زمان حال که فرد پس از کاسته شدن آن، پاداش همراه با وقفه را برگزیده است، به عنوان ارزش پاداش همراه با وقفه (A) در اثر گذر زمان مشخص (D) تعیین می‌گردد. بدینه است که بر اساس آنچه گفته شد، میزان A/V تابعی از وقفه زمانی ارائه شده خواهد بود ( $V = A \times f(D)$ ). اما اکنون این سوال مطرح می‌شود که منطق ریاضی حاکم بر این تابع چیست؟

**تحلیل ریاضی فرآیند کاهش ارزش تعویقی**  
 برای تحلیل فرآیند کاهش ارزش پاداش با گذشت زمان، تاکتون از روش‌های متفاوتی استفاده شده است. در معروفترین و کاربردی ترین این روش‌ها (مازور<sup>۲</sup>، ۲۰۰۰) نموداری ترسیم می‌شود که محور افقی آن نمایشگر زمان (وقفه) و محور عمودی آن نمایانگر ارزش معادل پاداش به تأخیر افتاده می‌باشد. طول (x) نقاط مشخص شده این نمودار، معادل زمان وقفه (D) و عرض (y) این نقاط، معادل ارزش پاداش ثابت (V) در اثر وقفه D (یا همان طول نقطه) خواهد بود. رفتار این نقاط را تابع (x)  $y = Af$  (یا  $V = A \times f(D)$ ) توجیه می‌کند. برای انجام این آزمایش ابتدا باید پاداشی با ارزش V در کنار پاداش با ارزش A و تأخیر D پیشنهاد و اگر V ترجیح داده شد، این کار دوباره به ازای  $V - \Delta V > 0$  (۳۵<sup>۳</sup>) انجام شود و اگر A انتخاب شد، آزمایش<sup>۴</sup> با ارزش  $V - \Delta V < 0$  (۳۶<sup>۴</sup>) انجام شود و اگر آنقدر کاهش می‌دهند ( $A/n$ ) تا نمونه مورد آزمایش پاداش آنی را آنقدر کاهش می‌شود. در این شرایط، نسبت پاداش همراه با وقفه (A) را انتخاب کند. در این شرایط، معادل ارزش A در اثر وقفه D در نظر گرفته می‌شود و  $A/n$  معادل ارزش تعویقی در نمونه‌های انسانی، عموماً به وسیله ارائه انتخاب‌های دو گزینه‌ای<sup>۵</sup> صورت می‌گیرد. برای مثال از فرد پرسیده می‌شود که شما کدام یک از موارد زیر را ترجیح می‌دهید: ۹۶ هزار تومان در حال حاضر یا ۱۰۰ هزار تومان برای فردا. در این گونه سوال‌ها عموماً ارزش یک مقدار ثابت پاداش (A) با یک وقفه زمانی

ساماندهی شده است. در این مقاله تلاش خواهد شد تا نقش عامل زمان در شکل دهنده این نوع تصمیم‌گیری و ارزش دهنده به گزاره‌ها در قالب فرآیندهای کاهش ارزش تعویقی (DD)<sup>۱</sup> بررسی گردد.

### فرآیند کاهش ارزش تعویقی

در فرآیند تصمیم‌گیری مخاطره‌آمیز به هنگام انتخاب بین گزینه‌ها، برای پاداش‌ها یا جریمه‌های با وقفه زمان کوتاه‌تر (در مقایسه با پاداش‌ها یا جریمه‌های با تعویق زمانی طولانی‌تر) ارزش بالاتری در نظر گرفته می‌شود. به عبارت دیگر، بار ارزشی پاداش با تبیه هر گزینه بر اساس تابعی از زمان ارائه این پاداش یا تبیه تحلیل می‌شود. بر اساس این تابع، به علت گذر زمان، ارزش واقعی یک پاداش یا گزینه رو به کاهش است. این فرآیند که اصطلاحاً کاهش ارزش تعویقی (DD) خوانده می‌شود، ابتدا مورد توجه اقتصاددانی نظیر لنکستر (1963) و مایر (1976) قرار گرفت و سپس در مطالعاتی که روی فرآیند رفتارهای تکانشی حیوانات انجام شد، کاربرد گسترده‌ای یافت. در دهه گذشته، با استفاده از این مفهوم مطالعاتی روی نمونه‌های انسانی انجام شده است.


برای بررسی این فرآیند در نمونه‌های حیوانی، در یکی از روش‌ها دو پدال در مقابل حیوان آزمایشگاهی قرار می‌گیرد؛ فشردن پدال اول بلاfacile به ارائه پاداشی کوچک منجر می‌گردد و فشردن پدال دوم پاداشی بزرگتر، اما با یک وقفه زمانی در اختیار حیوان مورد آزمایش قرار می‌دهد. پژوهشگران برای تعیین ارزش یک پاداش در اثر ایجاد یک وقفه زمانی ثابت (D)، میزان پاداش آنی را آنقدر کاهش می‌دهند ( $A/n$ ) تا نمونه مورد آزمایش پاداش همراه با وقفه (A) را انتخاب کند. در این شرایط، نسبت پاداش در اثر وقفه D در نظر گرفته می‌شود و  $A/n$  معادل ارزش A در اثر وقفه D محاسبه می‌گردد. بررسی فرآیند کاهش ارزش تعویقی در نمونه‌های انسانی، عموماً به وسیله ارائه انتخاب‌های دو گزینه‌ای<sup>۶</sup> صورت می‌گیرد. برای مثال از فرد پرسیده می‌شود که شما کدام یک از موارد زیر را ترجیح می‌دهید: ۹۶ هزار تومان در حال حاضر یا ۱۰۰ هزار تومان برای فردا. در این گونه سوال‌ها عموماً ارزش یک مقدار ثابت پاداش (A) با یک وقفه زمانی

1- delayed discounting  
3- indifference point  
5- trial

2- two choice questions  
4- Mazur

فرم‌های دیگر تابع هیبرولیک مانند<sup>۶</sup>  $V(D) = A/(1+KD)$  نیز استفاده شده که عموماً ضریب همبستگی‌های کمتری داشته‌اند.

اثر تفاوت رایج در تابع هیبرولیک



شکل ۱- بررسی اثر تفاوت رایج امکان پذیر در تابع هیبرولیک، در مقایسه با عدم امکان رویداد این پدیده در تابع نمایی

**کاربردهای فرآیند کاهش ارزش تعویقی**  
در چند سال گذشته، استفاده از آزمون‌های ارزیاب فرآیند کاهش ارزش تعویقی، برای ارزیابی جنبه‌های شناختی رفتارهای تکانشی (به معنی ترجیح پاداش‌های کوچک ولی سریعتر، بر پاداش‌های بزرگتر اما همراه با وقفه) مورد توجه فسروار گرفته است. هرچند با توجه به علاقه‌مندی‌های خاص گروه‌های پژوهشگر، این پژوهش‌ها به طور عمده به حیطه اعتیاد معطوف بوده‌اند، اما محدود مطالعات حیطه‌های دیگر نیز یافنگ نتایج جالب توجهی می‌باشند.

می‌شود. این روش امکان دستیابی به نقاط بیشتر در زمان کمتر را فراهم می‌کند.

تابه حال برای توصیف این نقاط، از تابع ریاضی مختلفی استفاده شده است که از این میان تابع نمایی<sup>۷</sup> و هیبرولیک ( $V = A/(1+KD)$ ) از همه معروف‌ترند. تابع نمایی که از گذشته برای توصیف پدیده کاهش ارزش کارآیی در علم اقتصاد مورد استفاده قرار می‌گرفته‌اند، در توصیف اثر تفاوت رایج<sup>۸</sup> (که در این آزمایش به کرات رخ می‌دهد)، قاصر هستند. اثر تفاوت رایج به این شکل است که وقتی در آزمایش، ارزش پاداش مشخص را کمتر می‌کنیم و تمامی زمان‌ها را به میزان ثابتی به آینده انتقال می‌دهیم، یعنی مرتب‌اپاداشی را در زمان  $T-X$  با پاداش‌های متفاوتی در زمان  $T$  مقایسه می‌کنیم و نقاط شکست را به دست می‌آوریم و نتایج را با نتایج حالت بدون انتقال روی یک نمودار رسم می‌کیم، می‌بینیم که دو نمودار یکدیگر را قطع می‌کنند (شکل ۱). بدین معنی است که در زمان‌هایی که اهدای پاداش کم ارزش‌تر نزدیک است، این پاداش به پاداش با ارزش‌تر ترجیح داده می‌شود. تابع نمایی، توانایی توصیف این پدیده را ندارند، زیرا انتقال یک تابع به سمت راست و کمتر کردن مقدار شروع آن باعث نمی‌شود تابع قبلی را قطع کند (شکل ۱).

برای توصیف این نمودارها، از دسته دیگری از تابع به نام هیبرولیک که به شکل ۱-  $V(D) = A/(1+KD)$  هستند، استفاده شده است. در این تابع،  $A$  ارزش پاداش مشخص،  $D$  زمان و  $K$  ثابتی است که با استفاده از روش حداقل مربعات خطای روی داده‌ها به دست می‌آید و نشان دهنده میزان کم ارزش شدن پاداش با گذشت زمان است. هرچه  $K$  بیشتر باشد، پاداش با ارزش‌تر کم ارزش می‌شود و شب نمودار افزایش می‌یابد. این دسته از توابع، توانایی توصیف پدیده تفاوت رایج را نیز دارند، زیرا با کمتر کردن ارزش مشخص آنها و انتقال آنها به سمت راست، تابع قبلی را قطع می‌کنند. از این توابع برای توصیف داده‌های این آزمایش به کرات استفاده شده است و ضریب همبستگی‌های غیر خطی (۲<sup>۹</sup>) خوبی را هم به دست داده‌اند. برای توصیف این داده‌ها از



آنده<sup>۱۱</sup>؛ ۲- تخمین زمان<sup>۱۲</sup> و آسیب آن به صورت افزایش تخمین<sup>۱۳</sup>؛ ۳- بازسازی زمان<sup>۱۴</sup> و آسیب آن به صورت کاهش بازسازی<sup>۱۵</sup>؛ ۴- سنجش وقفه<sup>۱۶</sup> و آسیب آن به صورت وقفه گریزی. مفاهیم فوق در درجاتی با یکدیگر و با مفهوم کاهش ارزش تعویقی همپوشانی دارند، اما بررسی هر کدام به صورت مجزا نیز امکان پذیر است.

این مطالعه در راستای تهیه ابزارهای بررسی ساختار تصمیم‌گیری مخاطره‌آمیز و به ویژه بررسی فرآیند کاهش ارزش تعویقی انجام شد.

## روش

**آزمون فارسی کاهش ارزش تعویقی**  
در نمونه کامپیوتری این آزمون که بر اساس منطق استاندارد طرح ریزی شد، برای هر وقفه، مقادیر ارزش کاهش یابنده به صورت متواالی مطرح می‌شوند تا فرد در نقطه‌ای مقدار پاداش همراه با وقفه را برگزیند (نقطه شکست). در این هنگام سوالات مربوط به وقفه بزرگتر از مقادیر بالا به صورت کاهش یابنده شروع می‌شود. در طراحی این نسخه از همان مقادیر مورد استفاده آزمون‌های کتبی مطالعات غربی استفاده شده است که از امکانات جدید آن می‌توان به مثال ابتدایی آزمون (شکل ۲)، فاصله‌گذاری بین انتخاب‌ها (شکل ۲ج) و امکان تغییر مقادیر ازانه شده اشاره کرد. توضیحات بیشتر در مورد نحوه عملکرد آزمون و نتایج بررسی‌های اولیه به وسیله این نسخه در ادامه این مقاله آمده است.

مؤلفان مقاله پس از تهیه نسخه استاندارد آزمون بررسی کاهش ارزش تعویقی (شکل ۲)، آنرا در گروهی از دانشجویان سال آخر پژوهشگاه علوم پزشکی تهران ارزیابی کردند که نتایج آن در ذیل آمده است.

1- delay aversion	2- Petry
3- Casarella	4- Alessi
5 - South Oaks Gambling Scale	6- Eysenck Impulsivity Questionnaire
7- Holt	8- Green
9- Myerson	10- future horizons
11- future myopia	12- time estimation
13- over estimation	14- time reproduction
15- under reproduction	16- delay assessment

الف) فرآیند کاهش ارزش تعویقی و پدیده سوء مصرف مواد. اگر یکی از جنبه‌های عملده ساختار شناختی معنادان را گرایش به پاداش‌های آنی و وقفه گریزی<sup>۱</sup> بدانیم (با توجه به ملاک‌های تشخیصی وابستگی و سوء مصرف مواد در ICD-10 و DSM-IV)، بررسی فرآیند کاهش ارزش تعویقی در این گروه می‌تواند نتایج چشمگیری به همراه داشته باشد.


ب) فرآیند کاهش ارزش تعویقی و جنبه‌های دیگر رفتارهای تکانشی. مطالعاتی که تاکنون انجام شده است، نشانگر افزایش میزان DD در اثر همراهی قماربازی پاتولوژیک با سوء مصرف مواد (پتری<sup>۲</sup> و کاسارلا<sup>۳</sup>، ۱۹۹۹) و افزایش میزان DD در اثر همراهی شخصی ضد اجتماعی با سوء مصرف مواد (پتری، ۲۰۰۲) می‌باشد. مطالعه جدید آلسی<sup>۴</sup> و پتری<sup>۵</sup> (۲۰۰۳)، نشانگر ارزش اخباری بالای شاخص قماربازی سوت اوکس<sup>۶</sup> (SOGS) و پرسشنامه نکاشنگری آیزنک<sup>۷</sup> (EIQ) برای تفاوت معنی دار میزان DD می‌باشد (SOGS ۱/۴ برابر EIQ). در مطالعه‌ای دیگر که توسط هولت<sup>۸</sup> و همکاران انجام شد (هولت، گرین<sup>۹</sup> و مایرسون<sup>۱۰</sup>، ۲۰۰۳)، گروهی از دانش‌آموزان یک کالج بر اساس شاخص SOGS به دو دسته قمارباز و غیر قمارباز تقسیم شدند، سیس میزان DD همراه با کاهش ارزش پاداش‌ها در اثر ایجاد احتمال در آنها بررسی شد. در این مطالعه، DD هر دو گروه یکسان بود و فقط نمودار کاهش ارزش یک پاداش در اثر افزایش درجات احتمال پرداخت آنها در گروه قمارباز شبیه کنده‌تری داشت (به معنای خطرپذیری بالاتر). بر اساس این مطالعه به نظر می‌رسد وجود یک جوهر مستقل به معنای تکاشنگری با اجزای خطرپذیری و عدم توانایی در به تعویق انداختن پاداش‌ها زیر سوال باشد.

کاربردهای دیگر مفهوم زمان در تصمیم‌گیری مخاطره‌آمیز. در فرآیند تصمیم‌گیری مخاطره‌آمیز، جنبه‌های دیگری از مفهوم زمان مورد توجه می‌باشد که از آن میان می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:  
۱- عمق افق‌های زمانی<sup>۱۱</sup> و آسیب آن به صورت کوری به




حامد اختیاری و همکاران


## روش اجرا



الف



ب



ج

شکل ۲- تصاویر صفحه نمایش رایانه در نسخه فارسی آزمون کاهش ارزش تعویقی

### یافته‌ها

نقاط شکست افراد برای هشت مقدار وقه (شش ساعت، یک روز، یک هفته، دو ماه، شش ماه، یک سال، پنج سال و بیست و پنج سال) به عنوان نمرات افراد در آزمون در نظر گرفته شد. میانگین و انحراف معیار این نمرات برای کل افراد (زنان و مردان) در جداول ۱، ۲ و ۳ خلاصه شده‌اند.

۱۰۰ نفر از کارورزان پژوهشکی (۷۵ مرد و ۲۵ زن) حاضر در بیمارستان روزبه در طی مجموعاً پنج ماه متولی با درخواست حضوری مجریان طرح و پس از اعلام رضایت برای شرکت در مطالعه، به وسیله نسخه فارسی کامپیوتری آزمون کاهش ارزش تعویقی (با منطق استاندارد) مورد سنجش قرار گرفتند. در این مطالعه جز معیارهای فوق، معیاری برای ورود یا خروج افراد از مطالعه در نظر گرفته نشد.

در این مطالعه، آزمودنی‌ها پس از دریافت پاره‌ای توضیحات و مشاهده چند مثال و آشنایی با نحوه عملکرد نرم‌افزار کامپیوتری (شکل ۲-الف)، در طی آزمون، در هشت مرحله پی در پی با سوال‌هایی مواجه می‌شوند که بر اساس آنها می‌بایست بین دریافت ۱۰۰ هزار تومان بعد از یک وقه ثابت و دریافت مقادیر در حال کاهش (۹۹۹۰۰ تومان، ۹۹۵۰۰ تومان و ...) در زمان حال، یکی را انتخاب کنند. پس از آنکه فرد دریافت ۱۰۰ هزار تومان با وقه را به دریافت مبلغ فوری ترجیح داد، مقدار مبلغ فوری به عنوان ارزش ۱۰۰ هزار تومان بعد از وقه مربوطه ثبت می‌شود و فرد در مرحله بعد با میزان وقه بعدی مواجه می‌گردد (وقه‌ها: شش ساعت، یک روز، یک هفته، دو ماه، بیک سال، پنج سال، بیست و پنج سال). به این صورت برای هر فرد، هشت مقدار به عنوان ارزش ۱۰۰ هزار تومان در طی وقه‌های فوق در یک بانک اطلاعاتی ثبت می‌شود. گزینه‌ها روی صفحه نمایش (مانیتور) به صورت دو جعبه خاکستری با ذکر مقدار و وقه درون جعبه‌ها مشخص می‌شود (شکل ۲). فرد پس از انتخاب هر یک از گزینه‌ها (فسردن جعبه مربوطه) می‌بایست برای رجوع به سوال بعد، جعبه دیگری را که در پایین با عنوان «سؤال بعد» باز شده است، انتخاب کند. پس از انجام هر مرحله و تعیین مقدار ارزش پاداش ۱۰۰ هزار تومان در اثر وقه مربوطه، وارد مرحله بعد و ارزیابی اهمیت وقه بعدی می‌گردد.

نتایج جمع‌آوری شده در بانک‌های اطلاعاتی، به وسیله نرم افزارهای SPSS-11 و MATLAB تحلیل شد.



همانطور که از اعداد مندرج در جداول نیز مشخص است، در این مطالعه هیچ اختلاف معنی‌داری بین گروه زنان و مردان مشاهده نمی‌شود.

بر طبق مطالعات گذشته، نمودار هیپرولیک با فرمول  $A/1+KD$  بر  $V = A$ : مقدار اولیه با وقفه،  $V = Ae^{-KD}$ : ارزش مقدار اولیه در اثر وقفه با همان نقطه شکست و  $D$ : وقفه در اکثر مقالات چاپ شده، مناسب‌ترین منطق برای توجیهتابع کاهش ارزش تعویقی می‌باشد، اما منطق نمایی یا  $V = Ae^{-KD}$  نیز در مطالعاتی مورد توجه قرار گرفته است. مؤلفان مقاله بر اساس این دو تابع با استفاده از نرم‌افزار MATLAB، نزدیکترین  $K$  ممکن برای بهترین توجیه رفتار نقاط شکست در طی وقفه‌های هشت گانه را بر اساس روش حداقل مربعات خطای محاسبه نمودند (جدول شماره ۴). ضریب همبستگی رگرسیون غیرخطی ( $r^2$ ) مندرج در جدول شماره ۴، نشانگر میزان انطباق نمودار مربوط به رفتار نقاط شکست هشت گانه می‌باشد:

همانطور که از مقایسه میزان ۲۷ ها در جدول ۴ مشخص است، نمودار هیپرولیک در مطالعه ما نیز بهترین توجیه گر تابع کاهش اهمیت تعویقی می‌باشد. بر اساس منطق هیپرولیک و کلبه دست آمده، می‌توان نمودار تابع کاهش ارزش تعویقی را رسم نمود (شکل ۳).

**جدول ۴**- مقادیر ثابت کاهش ارزش تعویقی ( $k$ ) و ضریب همبستگی رگرسیون غیرخطی ( $r^2$ ) برای دو منطق نمایی و هیپرولیک جهت تفسیر رفتار نقاط شکست هشت گانه آزمون کاهش ارزش تعویقی، به تغییک گروه آزمودنی‌های مذکور و متوسط  $A$  مقدار اولیه با وقفه (۱۰۰ هزار نومان)،  $D$ : وقفه به ماه]

$Ae-KD$	$A$ 1+KD	منطق نمودار	
		گروه آزمودنی	
$K = 0/034$ $r^2 = 0/7742$	$K = 0/059$ $r^2 = 0/9093$	آزمودنی‌های متوسط	
$K = 0/037$ $r^2 = 0/8294$	$K = 0/060$ $r^2 = 0/9402$	آزمودنی‌های مذکور	
$K = 0/037$ $r^2 = 0/8166$	$K = 0/060$ $r^2 = 0/9334$	کل افراد	

جدول ۱- میانگین نقاط شکست به م ERA انحراف معیار برای ۱۰۰ هزار نومان به ازای هشت مقدار وقفه در نسخه فارسی کامپیوترا آزمون کاهش ارزش تعویقی با منطق استاندارد در کل آزمودنی‌ها (مقادیر به نومان است) (تعداد افراد: ۱۰۰ نفر).

وقفه	میانگین	انحراف معیار
شش ساعت	۹۶۲۸۰	۵۴/۶۴
یک روز	۹۴۳۵۷	۵۴/۴۷
یک هفته	۹۰۳۹۷	۱۱۲/۶۲
دو ماه	۸۰۷۵۰	۱۵۷/۲۰
شش ماه	۶۸۸۶۲	۲۰۹/۳۰
یک سال	۵۵۶۰۸	۲۲۷/۰۴
پنج سال	۳۳۳۵۰	۲۴۴/۱۰
بیست و پنج سال	۱۴۳۰۸	۱۹۳/۶۰

جدول ۲- میانگین نقاط شکست به مERA انحراف معیار برای ۱۰۰ هزار نومان به ازای هشت مقدار وقفه در نسخه فارسی کامپیوترا آزمون کاهش ارزش تعویقی با منطق استاندارد در آزمودنی‌های مذکور (مقادیر به نومان است) (تعداد افراد: ۷۵ نفر).

وقفه	میانگین	انحراف معیار
شش ساعت	۹۶۲۵۰	۵۶/۰۹
یک روز	۹۴۵۱۲	۹۱/۴۹
یک هفته	۹۰۸۳۲	۱۱۹/۷۵
دو ماه	۸۱۰۶۸	۱۱۵/۴۵
شش ماه	۶۸۸۶۹	۲۱۳/۵۲
یک سال	۵۵۷۸۴	۲۵۲/۶۳
پنج سال	۳۲۵۰۶	۲۵۱/۰۱
بیست و پنج سال	۱۴۱۱۶۳	۱۹۲/۲۰

جدول ۳- میانگین نقاط شکست به MERA انحراف معیار برای ۱۰۰ هزار نومان به ازای هشت مقدار وقفه در نسخه فارسی کامپیوترا آزمون کاهش ارزش تعویقی با منطق استاندارد در آزمودنی‌های متوسط (مقادیر به نومان است) (تعداد افراد: ۲۵ نفر).

وقفه	میانگین	انحراف معیار
شش ساعت	۹۶۱۶۰	۵۱/۱۳
یک روز	۹۳۸۹۲	۷۰/۷۲
یک هفته	۸۹۰۹۲	۸۸۷۷۳
دو ماه	۷۹۷۹۶	۱۶۵/۶۲
شش ماه	۶۸۸۴۰	۲۰۰/۲۴
یک سال	۵۵۰۸۰	۷۳۷/۳۷
پنج سال	۳۵۸۸۰	۲۲۵/۰۲
بیست و پنج سال	۱۴۷۳۲	۲۰۱/۹۵



امکان پذیر است، اما در عموم مطالعات در مقایسه دو یا چند گروه مورد بررسی ابتدا میانگین نقاط شکست افراد برای هر یک از گروههای مورد بررسی، محاسبه و سپس K نمودار میانگین گروههای مختلف به طور جداگانه محاسبه و مقدار آنها با یکدیگر مقایسه می‌گردد.

## بحث


فرآیند کاهش ارزش تعیقی پاداش‌ها یا آسبی‌ها، به عنوان یکی از زیر ساخت‌های تصمیم‌گیری مخاطره‌آمیز در سال‌های گذشته مورد توجه پژوهشگران حیطه‌های شناختی رفتارهایی مانند سوء مصرف مواد، قماربازی پاتولوژیک و دیگر رفتارهای تکانشی قرار گرفته و مطالعات زیادی نیز در این زمینه شده است. مؤلفان این مقاله تلاش کردند تا برای ارزیابی این فرآیند ابزاری کامپیوتری به زبان فارسی معرفی کنند و نتایج اولیه آن را در یک گروه افراد نرمال (۱۰۰ نفر از دانشجویان دو سال آخر رشته پزشکی) ارائه دهند. نتایج این بررسی نیز همان طور که مطالعات جوامع غربی نشان داده است، از قاعده هیبروبولیک ( $V=A/(1+KD)$ ) تعیت می‌کند، هرچند مقدار کاهش اهمیت پاداش‌ها در مطالعه ما از نمونه‌های غربی بیشتر است که این می‌تواند تحت تأثیر عوامل زیر باشد:

۱. به نظر می‌رسد در شرایط اجتماعی - اقتصادی حاکم بر کشور ما (نرخ تورم بالا و سوابق اقتصادی ناپایدار)، میزان کاهش اهمیت تأخیری پول بالاتر از جوامع غربی باشد (با وجود اینکه ما در توضیحات آزمون تأکید کرده بودیم که فرض کنید ارزش پول با گذشت زمان تغییر نکند).
۲. با توجه به سوابق ذهنی و تجربیات اقتصادی افراد احتمال دارد نوعی بی‌اعتمادی نسبت به پرداخت پاداش در سال‌های آینده، زمینساز افزایش کاهش ارزش تأخیری پول در مطالعه ما باشد.
۳. نزدیکترین مقدار K مربوط به افراد نرمال در مطالعات غربی، به مقدار K حاصل از مطالعه ما، یعنی  $0.059$ ، مربوط به مطالعه پتری و کاسارلا (۱۹۹۹) (جدول ۶) با مقدار  $0.03$  برای مبلغ ۱۰۰ دلار می‌باشد. همان طور که در ابتدای مقاله آمد، ما می‌دانیم مقدار K در اثر افزایش مقدار پاداش کاهش می‌یابد،

در یکی از مطالعاتی که برای بررسی رفتار تابع کاهش اهمیت تعیقی ( $V=AF(D)$ ) در سینه مختلف انجام شده (گرین، مایرسون و استازوسلسی<sup>۱</sup>، ۱۹۹۹)، پیشنهاد شده است که از توان متغیر D در مخرج کسر نمودار هیبروبولیک  $[V=A/(1+KD)^5]$  برای توجیه بهتر عملکرد تابع کاهش ارزش تعیقی استفاده شود. اضافه کردن این فاکتور در مطالعه ما نیز موجب شد مقدار  $2^2$  تا حدود  $0.98$  بهبود یابد (جدول ۵).

جدول ۵- مقایسه مقادیر ثابت کاهش ارزش تعیقی (K) و ضریب مبتنی‌گری گرگرسون غیرخطی ( $R^2$ ) بر طبق تابع  $V=A/(1+KD)$  در مطالعه مؤلفان مقاله و مطالعه گرین و همکاران (۱۹۹۹) (A: مقدار اولیه بدoul و قصه؛ V: ارزش مقدار اولیه بعد از وقت؛ D: مقدار وقت به ماه)

پژوهش	مقادیر K	مقادیر $R^2$	مقادیر S
گرین و همکاران، ۱۹۹۹ (به ارزی ۱۰۰۰ دلار)	کودکان: ۰.۶۱۸	۰.۹۹۵	۰.۳۶۸
	جوانان: ۰.۰۷۵	۰.۹۹۶	۰.۷۲۴
	بزرگسالان: ۰.۱۰۱	۰.۹۹۸	۰.۹۵۷
اختیاری و همکاران (منتشر شده) (به ارزی ۱۰۰ هزار تومان)	زن: ۰.۱۷۰	۰.۹۷۵۳	۰.۳۵۴
	مرد: ۰.۱۲۸۳	۰.۹۸۴۴	۰.۴۰۴
	کل: ۰.۱۳۰۲	۰.۹۸۲۴	۰.۳۹۱



شکل ۳- نمودار کاهش ارزش تعیقی بر اساس منطقی هیبروبولیک و میزان انتباخ آن بر رفتار نقاط شکست، به ارزی وقتی هشت گانه. نقاط اطراف نمودار، شانگر میانگین نقاط شکست در آزمون کاهش اهمیت تعیقی می‌باشد (Mقدار وقتی به ماه در نظر گرفته شده است).

شایان ذکر است که در تحلیل نتایج آزمون کاهش اهمیت تعیقی، محاسبه میزان K و  $R^2$  و حتی S برای تک تک افراد



جدول ۶- مقادیر ثابت کاهش ارزش تعویقی ( $K$ ) و ضریب مبتکنی رگرسیون غیرخطی ( $r^2$ ) برای نمودار کاهش ارزش تعویقی با منطق هیربوریک در چند مطالعه دیگر با شرایط کاملاً مشابه در مقایسه با مطالعه انجام شده به وسیله مولفان مقاله (وقتمعاً به ماه محاسبه شده است و منطق همه آزمون‌ها از نوع استاندارد است).

پژوهش	مقادیر $K$	مقادیر $r^2$	ملاحظات
بیکل <sup>۱</sup> ، ادوم <sup>۲</sup> و مادن <sup>۳</sup> ، ۱۹۹۹ (به ازای ۱۰۰۰ دلار)	۰/۰۵۴:CS	۰/۸۹:CS	افرادی که اکنون سیگاری هستند.
	۰/۰۷۵:NS	۰/۸۱:NS	افرادی که هیچ گاه سیگاری نبوده‌اند.
	۰/۰۰۷۱:ES	۰/۸۳:ES	افرادی که قبل از سیگاری بوده‌اند.
پتری و کاسارلا، ۱۹۹۹ (به ازای ۱۰۰ دلار)	۰/۰۳:Control	۰/۹۹:Control	:NGA
	۰/۱۲:NGA	۰/۹۹:NGA	:PGA
	۰/۳۶:PGA	۰/۹۹:PGA	:PGA
	۰/۰۲:Control	۰/۹۹:Control	:Control
	۰/۰۵:NGA	۰/۹۹:NGA	:NGA
	۰/۰۶:PGA	۰/۹۸:PGA	:PGA
ادوم و رینتاد <sup>۴</sup> ، ۲۰۰۳ (به ازای ۱۰۰۰ دلار)	۰/۶۲۴:NS	۰/۷۹:NS	:NS
	۰/۰۲۸:NN	۰/۷۸:NN	:NN
پتری، ۲۰۰۱ (به ازای ۱۰۰ دلار)	۰/۰۱۳:Control	۰/۹۹:Control	افرادی که اکنون الکلی هستند.
	۰/۰۴۱:CA	۰/۹۹:CA	:CA
	۰/۰۹۰:AA	۰/۹۹:AA	:AA
	۰/۰۰۶:Control	۰/۹۹:Control	الکلی‌هایی که دوره ترک را می‌گذرانند.
	۰/۰۳۹:CA	۰/۹۹:CA	:CA
	۰/۰۴۲:AA	۰/۹۹:AA	:AA
اختیاری و همکاران ( منتشر نشده ) (به ازای ۱۰۰ هزار تومان)	۰/۰۶۰:M	۰/۸۲:M	:M
	۰/۰۵۸:F	۰/۸۸:F	:F
	۰/۰۵۹:T	۰/۹۱:T	:T

مختلف اثبات شده است که مقدار  $K$  با ارزش یک پاداش نسبت معکوس دارد. از این قانون می‌توان برای تعیین و مقایسه میزان کارآیی<sup>۵</sup> پاداش‌های مختلف ( انواع و مقادیر متفاوت ) استفاده کرد، به صورتی که هرگاه  $K$  نمودار کاهش ارزش تعویقی پاداش A، بزرگتر از  $K$  نمودار مربوط به پاداش B باشد، می‌توان کارآیی پاداش B را بیشتر از پاداش A دانست. واضح است که کارآیی یک پاداش می‌تواند با ارزش مالی<sup>۶</sup> آن ارتباطی نداشته باشد. بر این اساس حتی می‌توان ادعا کرد

لذا می‌توان یکی از علل کم بودن مقدار  $K$  گروه نرم‌افزار مطالعات غربی ( $K$  حدود ۰/۰۰۶ تا ۰/۰۰۷) را استفاده از مقدار ۱۰۰۰ دلار (که برای یک آمریکایی ارزشی بالاتر از ۱۰۰ هزار تومان برای یک ایرانی دارد) دانست. احتمالاً معادل داشتن یک دلار با ۱۰۰۰ تومان در تبدیل مقادیر دلاری به تومان، منطقی ترین گزینه ممکن است. با وجود این پیشنهاد می‌شود با توجه به تمايل بیشتر مطالعات غربی به استفاده از مبلغ ۱۰۰۰ دلار، در مطالعات بعدی در ایران از مبلغ یک میلیون تومان برای محاسبه  $K$  نمودار کاهش ارزش تعویقی افراد استفاده شود.

۴. همان‌طور که در قسمت‌های قبلی مقاله آمد، در مطالعات

1- Bickel  
3- Madden  
5- utility

2- Odum  
4- Rainaud  
6- cost



چیست؟ با توجه به رویکرد گذشته‌نگر بسیاری از پژوهش‌هایی که تاکنون در این زمینه صورت گرفته است، پاسخ‌گویی به بسیاری از این سوال‌ها مقدور نیست و نیازمند طراحی مطالعاتی آینده‌نگر می‌باشد. با توجه به سادگی ابزارهای پژوهش در این زمینه، وابستگی مطالعات به خلاصه‌های فردی به جای امکانات و ابزارهای پیچیده و همچنین وابستگی بالای نتایج این پژوهش‌ها به مختصات فرهنگی و اقتصادی جامعه مورد بررسی و با توجه به فراوانی عوارض اجتماعی اعتیاد، خشونت، رفتارهای مجرمانه و ... با ویژگی‌های اختصاصی و بومی در کشور ما، پژوهش در این زمینه از اولویت بالایی برخوردار است.

## سپاسگزاری

مؤلفین مقاله از راهنمایی‌های دلسویزه و راهگشای استاد گرامی جناب آقای دکتر آذرخش مکری که بدون آنها انجام این پژوهش را هرگز مقدور نمی‌شد نهایت سپاسگزاری را به عمل می‌آورند. زحمات جناب آقای دکتر غلامرضا اسماعیلی جاوید در جایگاه مشاور آماری این طرح شایسته تقدیر است. همچنین تلاش جناب آقای مهندس فرید نعمتی نیز در جایگاه مشاور برنامه‌ریز کاسپوتویی گروه نیز سزاوار امتنان می‌باشد.

که حدود کارآیی این دو مقدار در ایران و آمریکا با توجه به نزدیک بودن K نمودار ۱۰۰ هزار تومان نمونه مورد بررسی ما (دانشجویان پزشکی) و K ۱۰۰ دلار نمونه‌های مورد بررسی مطالعات غربی برابر است.

با توجه به نوبتاً بودن به کارگیری آزمون‌های نوروپایکولوژیک در ارزیابی عملکردهای اجتماعی - اقتصادی افراد، هنوز مطالعه کاملی روی تامی جنبه‌های مورد بحث در این زمینه صورت نگرفته است و پیشنهاد می‌شود تحقیقات بیشتری در حیطه فرآیند کاهش ارزش تعویقی (DD) برای پاسخ به سوال‌های زیر انجام شود:

۱- آیا کودکان یا نوجوانانی که DD بالاتری دارند، برای ابتلاء پاتولوژی‌های موجود در رفتارهای اجتماعی (مانند سوء مصرف مواد) مستعدترند؟ ۲- آیا میزان DD معنادان مراجعه کشته به درمانگاه برای دریافت درمان، می‌تواند میزان امید به درمان آنها و عدم عود را مشخص کند؟ ۳- آیا می‌توان بر اساس تغییرات DD، نتایج درمانی را ارزیابی کرد؟ ۴- آیا سعی در اصلاح DD معنادان می‌تواند جزو اهداف درمانی درمان‌های بیولوژیک و غیر بیولوژیک باشد؟ ۵- ارتباط میان تغییرات DD و شاخص‌های بیولوژیک (مانند تغییرات فعالیت گیرنده‌های مختلف سروتونرژیک یا دوپامینرژیک) تحت تأثیر داروهای مختلف

## منابع

- اختیاری، ح.، و بهزادی، آ. (۱۳۸۰). قشر پره فرونال، اختلالات تصمیم‌گیری و آزمون‌های ارزیابی کننده. *فصلنامه تازه‌های علوم شناختی*، ۳(۲)، ۸۶-۹۴.
- اختیاری، ح.، و بهزادی، آ. (۱۳۸۰). ارزیابی ساختار تصمیم‌گیری مخاطره‌آمیز: شواهدی از یک تفاوت بین فرهنگی. *فصلنامه تازه‌های علوم شناختی*، ۴(۳)، ۲۶-۱۶.

Alessi, S.M., & Petry, N.M. (2003). Pathological gambling severity is associated with impulsivity in a delay discounting procedure. *Behavioural Processes*, 64(3), 345-354.

Bickel, W.K., Odum, A.L., & Madden, G.J. (1999). Impulsivity and cigarette smoking: Delay discounting in current, never, and ex-smokers. *Psychopharmacology*, 146, 447-454.

Green, L., Myerson, J., & Ostaszewski, P. (1999). Discounting of delayed rewards across the life span: Age differences in individual discounting functions. *Behavioral Processes*, 46, 89-96.

Holt, D.D., Green, L., & Myerson, J. (2003). Is discounting impulsive? Evidence from temporal and probability discounting in gambling and non-gambling college students. *Behavioral Processes*, 64 (3), 355-367.



Lancaster, K. (1963). An axiomatic theory of consumer time preference. *International Economic Review*, 4, 221-231.

Linnoila, M., Virkkunen, M., George, T., & Higley, D. (1993). Impulse control disorders. *International Clinical Psychopharmacology*, 8, 53-56.

Mazur, J.E. (2000). Tradeoffs among delay, rate, and amount of reinforcement. *Behavioral Process*, 49, 1-10.

Meyer, R.F. (1976). Preference over time. In R.L. Keeney & H. Raiffa (Eds.), *Decisions with multiple objectives: Preferences and value tradeoff*. Wily: New York.

Odum, A.L., & Rainaud, C.P. (2003). Needle sharing in opioid-dependent outpatients: Psychological Processes underlying risk. *Drug & Alcohol Dependence*, 60, 259-266.

Petry, N.M. (2002). Discounting of delayed rewards in substance abusers: Relationship to antisocial personality disorder. *Psychopharmacology*, 162, 425-432.

Petry, N.M. (2001). Delay discounting of money and alcohol in actively using alcoholics, currently abstinent alcoholics, and controls. *Psychopharmacology*, 154, 243-250.

Petry, N.M., & Casarella, T. (1999). Excessive discounting of delayed rewards in substance abusers with gambling problems. *Drug and Alcohol Dependence*, 56, 25-32.



پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی  
پرستال جامع علوم انسانی